

## Beiträge zur Kenntniss der Helophoren aus Europa und den angrenzenden Ländern.

Von A. Kuwert in Wernsdorf (Ostpreussen).

(Schluss. \*)

### 32. *Helophorus confrater* n. sp.

*Rhopalohelophorus*; species, quae ab *Atractohelophoro glaciali*, specie simillima, non aut vix, nisi colore rubro-testaceo pedum palporumque et articulo ultimo palporum non fusiformi distingui potest; quare descriptio, si vis, perfecta est. Corpore, elytris, capite, prothorace — omnibus nigro-aeneis, nitidis. Prothorace glabro; nisi in lateribus, nec punctato, nec rugoso; sulco medio in medio vix profundiore, vix foveato; sulcis internis in medio fortiter ac subito externe arcuatis; lateribus ante medium fortiter rotundatis, postice ante angulos posteriores parum excisis. Elytris post scutellum haud aut leviter depressis, quare discedit a *glaciali* valde impresso, punctato-striatis; interstitiis vix convexis. Pedibus rubro-testaceis, quare differt a *glaciali* et accedit ad *nivalem*. Palpis rubris; ultimo articulo externe incrassato, cuneato, aculeato, paene fusiformi; penultimo breviter triangulari.

Differt a *nivali* sp. alternis elytrorum interstitiis non elevatis et sulco medio prothoracis non aut leviter foveato, corpore etiam angustiore. Differt ab obscurioribus individuis obscuri Rey. Muls. prothorace longiore, ante medium dilatiore supraque elatiore ac laeviore. Long. 2.8 mm.

*Hungaria meridionalis.*

Ich erhielt 2 Stücke vor einigen Jahren, wenn ich nicht irre, aus Ungarn, für *glacialis* zugeschickt.

Das Thier dürfte in vielen Sammlungen unerkantet stecken. Wegen seiner grossen Aehnlichkeit mit *glacialis* habe ich dasselbe *confrater* genannt.

---

\*) Siehe diesen Jahrg., pag. 92.